

Dado un triángulo rectángulo isósceles \widehat{ABC} , sea M el punto medio de la hipotenusa BC . Tomemos un punto D y sea E la intersección de las rectas CD y AM . Determinar la localización de D para que $MD + DE = CE$.

SOLUCIÓN:

Ejercicio propuesto en MathLinks, por el usuario "kunny" (Kunihiko Chikaya, Japan).

<http://www.artofproblemsolving.com/Forum/viewtopic.php?p=1963707#p1963707>

con el siguiente enunciado:

"Given an isosceles right triangle ABC , let M be the mid point of the hypotenuse BC . Take a point D and let E be the intersection point of line segments CD and AM . Determine the location of D such that $MD + DE = CE$."

Se trata de encontrar los puntos que verifiquen $CD = CE + ED$, donde se tiene en cuenta la dirección de cada segmento.

Tomando un sistema de coordenadas cartesianas rectangular, tal que $A(0, 0)$, $B(1, 0)$ y $C(0, 1)$, se tiene que $M(1/2, 1/2)$ y $E(t, t)$. Debemos encontrar los puntos D que están en la intersección de la recta CE con la circunferencia de centro en M y radio CE , para ello se ha de eliminar t entre las ecuaciones:

$$(t - 1)x - ty + t = 0, \quad (x - 1/2)^2 + (y - 1/2)^2 = t^2 + (t - 1)^2.$$

Resultando la cuártica:

$$2x^4 - 4x^3y + 4x^2y^2 - 4xy^3 + 2y^4 + 2x^3 - 2x^2y + 6xy^2 - 6y^3 - 3x^2 - 2xy + 5y^2 - 1 = 0.$$

Esta curva tiene dos puntos de retroceso en $C(0, 1)$ y en el punto del infinito de la recta $y = x$. Sus asíntotas son $y = x$ y $y = x + 2$.

Referencia:

Angel Montesdeoca.- Gráficas de curvas en implícitas, paramétricas y polares.

<http://webpages.ull.es/users/amontes/apuntes/curvasgr.pdf>

